


Lesy na Pálavě

mezi intenzivním využíváním a ochranou biodiverzity



Radim Hédli, Markéta Chudomelová,
Ondřej Vild a další



Konference 50 let CHKO Pálava
23.–24. 9. 2026, Mikulov

Vzpomínky na Děvín před 20 lety



Zakládání trvalých ploch v roce 2008 (P. Szabó, V. Riedl)



Výzkum změn půd 2004 (K. Rejšek, J. Houška)

Vzpomínky na Milovický les



Sprašová doubrava v roce 2006



Snímkování trvalých ploch v roce 2018
(O. Vild, M. Chudomelová, M. Fabšičová)

Lesy tvoří významnou součást CHKO Pálava

CHKO Pálava

Celková rozloha: 8 540 ha

Z toho les: 2 434 ha / **28,5 %**

97,3 % lesů spravují Lesy ČR

90,7 % lesů je ve dvou EVL:

EVL Děvín


Celková rozloha: 406 ha

Z toho les: 264 ha / **65.1 %**


EVL Milovický les

Celková rozloha: 2443 ha

Z toho les: 1944 ha / **79.6 %**




Jaké jsou hlavní typy lesů Pálavy?




1) subkontinentální doubravy na spraši

největší celek u nás je v Milovickém lese



2) panonské dubohabřiny

mimořádný jarní aspekt na Děvíně s většinou geofytů



3) suťové lesy s lípou velkolistou na vápenci

asi největší populace oměje vlčího moru u nás



4) lužní lesy

návaznost na CHKO Soutok, Křivé jezero

5) šipákové doubravy s dřínem

fragmentárně, Milovická stráň a Děvín



<https://portal.nature.cz/w/uzemi-2881#/>









O čem budu mluvit?

Tři hlavní faktory dlouhodobých změn lesních biotopů.



1. Lesní hospodaření

Zásadní vliv mělo pařezení, které fungovalo po staletí v naprosté většině pálavských lesů.

Úpadek až během 19. století a úplné ukončení ve 30. letech 20. století.



2. Zvěř

Oborní chov spárkaté zvěře: muflon, jelen, daněk a koza bezoárová.

Milovický les: dvě velké obory v režii státu.

Děvín: obora až do 90. let 20. století.



3. Klimatická změna

Hlavně sucho, které se postupně zesiluje a periodicky se opakuje.

Letos bylo jedno z nejintenzivnějších, další lze nejspíš očekávat.




Na čem stavíme?

Unikátní monitorovací infrastruktura


Trvalé plochy

2008 ---

- Děvín: 85
- Milovický les: 75





15 m




Opakované plochy

1953–2000'

- Děvín: 161
- Milovický les: 46



3 572 ploch






Jak se změnily lesní biotopy během 20. století?


Postupný úbytek biodiverzity.

- Sukcesní posun ke stinným, úživnějším lesům.
- Úbytek druhové bohatosti, homogenizace.

400-500
m²




Posun v druhovém složení
lesní vegetace na Děvíně




Hédl 2005, Disertační práce

Pokles zastoupení druhů
teplomilných doubrav v
Milovickém lese



Hédl, Kopecký, Komárek 2010, Diversity and Distributions

Úbytek ohrožených
druhů cévnatých rostlin
v Milovickém lese






Jak se změnily lesní biotopy během 20. století?

Postupný úbytek biodiverzity.


- Pokus o souhrn před téměř 20 lety.

Tehdy jsme si mysleli, že v Milovickém lese:

- Hlavní je sukcese opuštěných pařezin
- Zvěř není úplně zásadní faktor
- O klimatické změně jsme vůbec neuvažovali





400-500
m²






Kam směřuje Milovický les?

Postupný posun k synantropním biotopům.




- Za posledních 70 let vegetace ztratila lesní charakter.
- Skok v posledních 10-15 letech.






Kam směřuje Milovický les?

Postupný posun k synantropním biotopům.





- Největší recentní zhoršení je v oborách.
- Mimo obory se vegetace celkem drží.






Kam směřuje Milovický les?

Eroze chráněných typů lesních stanovišť.




- Úbytek lesních ve prospěch nelesních druhů.
- Úbytek typických druhů chráněných biotopů Natura 2000.


Lesní druhy



Nelesní druhy



Typické druhy stanovišť N2000





A co klimatická změna?

Sucho postupně přebírá hlavní roli.

SPEI

Srážkovo-evapotranspirační index


Standardized Precipitation

Evapotranspiration Index

Trend
intenzifikace
sucha

celoroční průměry
1982–2026

Periody co 10 let
průměr za letní měsíce
2007–2026




stanice Brod nad Dyjí

vlhké roky

suché roky

---- lineární trend

— klouzávy 5letý trend







A co klimatická změna?

Podstatná je kombinace sucha a zvěře.


- Zlom v období 2015–2018 – předchozí vlna sucha.
- Trvalé zhoršení v oborách / odolnost mimo obory.



Lesní druhy



Ohrožené druhy




uvnitř obor


vně obor

Typické druhy stanovišť N2000


7.1 Hercynské dubohabřiny (L3.1)




7.2 Panonské dubohabřiny (L3.4)



7.3 Perialpidské bazilifilní teplomilné doubravy (L6.1)



7.4 Panonské teplomilné doubravy na spraši (L6.2)









A co klimatická změna?

Sucho zásadně ovlivňuje také regeneraci lesních rostlin.

- Srážky a světlo mají vliv na přežívání semenáčků.
- Suché roky (2026) přežívá minimum jedinců.



Faktory přežívání v 1. roce



Do konce svého
1. roku:

přežily

umřely

Závěry a snad nebude tak zle...

Zapojování lesa stojí za dlouhodobým, pomalým úbytkem lesní biodiverzity.

Podpořeno v rámci výzkumného programu Strategie AV21
„Globální krize biodiverzity: rizika a příležitosti pro lidskou společnost“



**Krize
biodiverzity**



Kombinace oborní zvěře a *budoucího* sucha je zásadním problémem pro ochranu biodiverzity.



STRATEGIE AV21

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu